



**PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DISFAGIA PEDIÁTRICA
(PAD PED)**

Fabiola Custodio Flabiano Almeida – Karina Elena Bernardis Buhler – Suelly Cecilia Olivan Limongi

ANAMNESE

Data da avaliação		Protuário	
-------------------	--	-----------	--

1 – Identificação:			
Nome			
Nome da mãe			
Data nascimento		Idade	
Peso atual			
2 - Internação Hospitalar:			
Tempo de internação			
Diagnóstico de internação			
Queixas relativas à deglutição			
Medicações atuais			
3 - Antecedentes			
Internações prévias / motivos			
Intercorrências pré-natais			
Intercorrências perinatais			
Idade gestacional			
IOT			
Problemas cardíacos			
Problemas respiratórios			
4 – Histórico Alimentar			
Posição			
Duração			
Via alternativa de alimentação			
Consistências introduzidas			
Quantidade			
Utensílios utilizados			
Intercorrências durante a alimentação			
Estado nutricional			
Alergias alimentares ou intorelância			



AValiação CLÍNICA DA DISFAGIA PEDIÁTRICA (PAD PED)

Data da avaliação	
Nome	
1 – Condições Clínicas	
Via de alimentação	() SNG () SOG () SOE () VO
Respiração	() ar ambiente () suporte respiratório () CPAP () BIPAP () oxitenda () venturi _____% () nebulização () cateter O ₂ _____ 1/minuto
2 – Sinais Prévios á Oferta	
FC _____ bpm	Referência: <2 anos: 80 a 160 entre 2 e 10 anos:70 a 120 >10 anos: 60 a 100
FR _____ irpm	Referência: <1 ano: 30 a 40 entre 1 e 10 anos:20 a 30 >10 anos: 18 a 20
SpO2 _____ %	Referência: >95%
Observações:	
3 – Exame Estrutural e Funcional	
Lábios:	
Postura durante repouso	() ocluídos () entreabertos
Tônus	() protusão () retração simétrica
Língua:	
Postura durante o repouso	() papila () assoalho bucal () interposta () simétrica () assimétrica
Tônus	() adequado () aumentado () diminuído
Mobilidade	() protrusão em linha média () desvio à _____
Presença de	() tremores () fasciculação () atrofia
Bochechas:	
Tônus	() adequado () aumentado () diminuído
Dentes:	
	() ausência () presença () falhas () BEC () MEC
Palato Duro	
	() adequado () alto
Palato Mole	
	() adequado () alto
Qualidade Vocal	
	() normal () rouca () soprosa () molhada () anasalada
4 – Avaliação de Deglutição de Saliva	
Aspecto da mucosa oral	() adequado () xerostomia
Frequência de deglutição da saliva	() adequado () sialoestase () sialorreia
Ausculta cervical de base	() normal () alterada durante a deglutição () alterada após a deglutição () alterada sem piora após a deglutição () alterada com piora após a deglutição
Ocorrências	() tosse () engasgo () cianose () palidez () desconforto respiratório
5 – Sucção Não Nutritiva – SNN (dedo enluvado ou chupeta)	
Reflexo de procura	() presente () ausente (Referência: presente até os três meses)
Pressão intraoral	() adequada () diminuída
Padrão de sucção	() adequado () inadequado
Frequência de deglutição da saliva	() adequado () inadequado
Ocorrências	() náusea () tosse () engasgo () cianose () palidez () desconforto respiratório
6 – Avaliação com Alimento:	
Seio materno	() NÃO AVALIADO
	() vedamento labial adequado () escape oral pelas comissuras labias () pega adequada () pega inadequada () relação frequência de sucções / deglutição _____ () pausa adequadas () ausência de pausas () coordenação sucção – respiração – deglutição () incoordenação
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontaneo () alterada após oferta sem clareamento espontaneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência: variação < 5% do valor basal) () alteração durante a oferta; FC _____ FR _____ SPO2 _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () desconforto repiratório () náusea () vômito () refluxo nasal () recusa alimentar
Tempo de alimentação	_____
Observações	



Policlínica Piquet Carneiro
Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais - CTAC
Serviço de Fonoaudiologia

Líquido Fino (mamadeira ou canudo) () NÃO AVALIADO	
	() bico comum () bico ortodôntico () canudo () vedamento labial () escape oral pelas comissuras labiais () preensão adequada do bico/canudo () preensão inadequada do bico/ canudo () relação frequência de succões/deglutição _____ () pausas adequadas () ausência de pausas () coordenação sucção-respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larígea ausente
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	
Líquido Fino (copo): A – gole grande B – gole livre () NÃO AVALIADO	
	() preensão adequada do copo () preensão inadequada do copo () escape oral pelas comissuras labiais () movimento de sorver () despejamento do líquido em cavida oral () frequência de sorções/deglutição _____ () coordenação sorção-respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larígea ausente
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	
Líquido Engrossado (mamadeira ou canudo) () NÃO AVALIADO	
	() bico comum () bico ortodôntico () canudo () vedamento labial () escape oral pelas comissuras labiais () preensão adequada do bico/canudo () preensão inadequada do bico/ canudo () relação frequência de succões/deglutição _____ () pausas adequadas () ausência de pausas () coordenação sucção-respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larígea ausente
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	



Policlínica Piquet Carneiro
Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais - CTAC
Serviço de Fonoaudiologia

Líquido Engrossado (copo): A – gole controlado B – gole livre () NÃO AVALIADO	
	() preensão adequada do corpo () preensão inadequada do corpo () escape oral pelas comissuras labiais () movimento de sorver () despejamento do líquido em cavida oral () frequência de sorver/deglutição _____ () coordenação sorções-respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larigea ausente
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	
Pastoso Homogêneo (colher) () NÃO AVALIADO	
	() captação adequada da colher () captação inadequada () escape oral anterior () movimento adequado de língua () movimentos póstero-anteriores () frequência de deglutições/bolo _____ () coordenação respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larigea ausente () resíduo em cavidade oral
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	
Pastoso Heterogêneo (colher) () NÃO AVALIADO	
	() captação adequada da colher () captação inadequada () escape oral anterior () padrão mastigatório adequado para a idade () padrão mastigatório inadequado para a idade () movimento adequado de língua () movimentos póstero-anteriores () frequência de deglutições/bolo _____ () coordenação respiração-deglutição () incoordenação () tempo de trânsito oral adequado () tempo de trânsito oral aumentado () elevação laringea presente () elevação larigea ausente () resíduo em cavidade oral
Ausculta cervical	() normal () alterada de base sem piora após oferta () alterada de base com piora após oferta () alterada durante a oferta () alterada após a oferta
Qualidade vocal	() não alterada após a oferta () alterada após a oferta com clareamento espontâneo () alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	() manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) () alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	() tosse eficaz () tosse ineficaz ou tardia () engasgo () cianose () palidez () náusea () vômito () desconforto respiratório () refluxo nasal () recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: () adequado () aumentado () diminuído
Observações	



Policlínica Piquet Carneiro
Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais - CTAC
Serviço de Fonoaudiologia

Sólido	() NÃO AVALIADO
	<input type="checkbox"/> preensão e quebra adequada do alimento <input type="checkbox"/> preensão e quebra inadequada <input type="checkbox"/> escape oral anterior <input type="checkbox"/> padrão mastigatório adequado para a idade <input type="checkbox"/> padrão mastigatório inadequado para a idade <input type="checkbox"/> coordenação mastigação-respiração-deglutição <input type="checkbox"/> incoordenação <input type="checkbox"/> tempo de trânsito oral adequado <input type="checkbox"/> tempo de trânsito oral aumentado <input type="checkbox"/> elevação laringea presente <input type="checkbox"/> elevação laringea ausente <input type="checkbox"/> resíduo em cavidade oral
Ausulta cervical	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> alterada de base sem piora após oferta <input type="checkbox"/> alterada de base com piora após oferta <input type="checkbox"/> alterada durante a oferta <input type="checkbox"/> alterada após a oferta
Qualidade vocal	<input type="checkbox"/> não alterada após a oferta <input type="checkbox"/> alterada após a oferta com clareamento espontâneo <input type="checkbox"/> alterada após a oferta sem clareamento espontâneo
Sinais vitais	<input type="checkbox"/> manutenção durante a oferta (Referência variação <5% do valor basal) <input type="checkbox"/> alteração durante a oferta: FC _____ FR _____ SpO _____
Ocorrências	<input type="checkbox"/> tosse eficaz <input type="checkbox"/> tosse ineficaz ou tardia <input type="checkbox"/> engasgo <input type="checkbox"/> cianose <input type="checkbox"/> palidez <input type="checkbox"/> náusea <input type="checkbox"/> vômito <input type="checkbox"/> desconforto respiratório <input type="checkbox"/> refluxo nasal <input type="checkbox"/> recusa alimentar
	Volume ofertado: _____ Volume Ingerido: _____ Tempo de alimentação: <input type="checkbox"/> adequado <input type="checkbox"/> aumentado <input type="checkbox"/> diminuído
Observações	

Classificação do Grau da Disfagia Pediátrica: _____

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DA DISFAGIA PEDIÁTRICA	
1. Deglutição normal	Ausência de sinais clínicos de disfagia.
2. Disfagia Orofaringea Leve	Presença de sinais clínicos decorrentes de inadequação durante a situação de alimentação. A disfagia é resolvida com adequações posturais, de utensílios e/ou fuxo.
3. Disfagia Orofaringea Moderada a Grave	Há grande suspeita de problemas na fase faríngea de deglutição ou alterações na fase oral com impacto importante na manutenção da nutrição e hidratação adequadas. Necessita de restrição de consistência e/ou via alternativa de alimentação complementar.
4. Disfagia orofaringea Grave	Impossibilidade de alimentação por via oral pelo alto risco de aspiração presumido. Necessita de via alternativa de alimentação exclusiva e pode necessitar de medidas de controle de aspiração de saliva.

Conclusão e Conduta

Data:

Carimbo e Assinatura:

Referenciar esse material como:

FLABIANO – ALMEIDA, Fabiola Custodio; BUHLER, Karina Elena Bernardis; LIMONGI, Suelly Cecilia Olivan. *Protocolo para avaliação clínica da disfagia pediátrica (PAD-PED)*. Editores científicos: Claudia Regina Furquin de Andrade e Suelly Cecilia Olivan Limongi. Barueri: Pró-fono, 2014. 33.p. (série Fonoaudiologia na Prática Hospitalar, V.1).